

CONDIȚII DE RECOLTARE, STOCARE ȘI TRANSPORT PROBE BIOLOGICE

Dublu Test (PAPP-A, free-beta HCG)	SCREENING PRENATAL SANGE MATERN	Sange periferic in tub clot activator	5 ml	<p>Se recolteaza sange periferic in tub clot activator (dop rosu).</p> <p>Lasati proba cca 1 ore la temperatura camerei dupa care se trimit la laborator sau centrifugati, separati serul si il plasati in frigider +4°C. Pentru pastrare mai mult de 48h serul se placeaza la -20°C.</p>	Livrare in max 48 h. La temp +4°C constant (sau cum am procedat pana acum)
---	--	---------------------------------------	------	---	---

Surditate ereditara mutatia 35delG	MOLECULARE	Sange	5 ml	<p>Se colecteaza sange periferic in tub cu EDTA (dop mov)</p> <p>Se recolteaza intr-un tub steril non-pyrogenic.</p>	La rece, la +4°C constant. Livrare in max 48 h. Nu se pune la centrifuga! Dupa recoltare se pune eprubeta in frigider si se scoate inainte de trimiterea prin curier in gentuta speciala.
Fibroza chistica gena CFTR mutatia DF508	MOLECULARE	Sange	5 ml	Se colecteaza sange periferic in tub cu EDTA (dop mov)	La rece, la +4°C constant. Livrare in max 48 h.

				Se recolteaza intr-un tub steril non-pyrogenic .	Nu se pune la centrifuga! Dupa recoltare se pune eprubeta in frigider si se scoate inainte de trimiterea prin curier in gentuta speciala.
Atrofia musculara spinala (SMA)	MOLECULARE	Sange	5 ml	Se colecteaza sange periferic in tub cu EDTA (dop mov) Se recolteaza intr-un tub steril non-pyrogenic .	La rece, la +4°C constant. Livrare in max 48 h.
Placental Growth Factor (PIGF)	SCREENING PRENATAL PREECLAMPSIE DIN SANGE MATERN	Sange periferic in tub clot activator	5 ml	Se recolteaza sange periferic in tub clot activator (dop rosu). Lasati proba cca 1 ore la temperatura camerei dupa care se trimit la laborator sau centrifugati, separati serul si il plasati in frigider +4°C. Pentru pastrare mai mult de 48h serul se placeaza la -20°C.	Livrare in max 48 h. La temp +4°C constant (sau cum am procedat pana acum).